

BUXUS HARLANDII

Buxus harlandii

FICHE DE CULTURE | BONSAI D'INTÉRIEUR

Buis asiatique persistant à croissance lente, apprécié pour son écorce mature et ses petites feuilles. En climat tempéré, il se cultive en intérieur très lumineux, avec une atmosphère aérée et des températures modérées.



01 EMPLACEMENT

Installer près d'une fenêtre très lumineuse, à l'écart des radiateurs et courants d'air. Privilégier une pièce fraîche en hiver. Sortie estivale possible à mi-ombre, après acclimatation progressive.

02 ARROSAGE

Humidité régulière sans stagnation; laisser sécher superficiellement entre deux apports. Vérifier l'humidité en profondeur avec une baguette avant d'intervenir. Arroser uniformément toute la motte, jusqu'à écoulement par les trous de drainage, puis laisser égoutter.

03 TAILLE

Rabattre les pousses après plusieurs paires de feuilles; éclaircir les masses compactes. Désinfecter les outils et conserver des rameaux relais. Éviter de cumuler taille sévère, repotage et forte ligature au cours d'une même période de récupération.

04 ENGRAIS

Engrais équilibré modéré au printemps et en automne; éviter les excès d'azote. Appliquer l'engrais sur un substrat déjà humide. Ajuster les quantités à la vigueur, à la lumière et au volume racinaire; interrompre les apports sur arbre affaibli.

05 REMPOTAGE

Printemps, tous les deux à trois ans; akadama et pumice, réduction racinaire progressive. Stabiliser l'arbre dans son pot et protéger du vent et du soleil intense après intervention. Reprendre la fertilisation uniquement après apparition d'une croissance saine.

06 LIGATURE

Bois ancien cassant; ne ligaturer que les rameaux souples, avec surveillance rapprochée. Poser les fils à angle régulier sans étranglement. Vérifier fréquemment la prise de diamètre; retirer en coupant les spires plutôt qu'en déroulant brutalement.

CONSEILS IMPORTANTS

Éviter l'intérieur sombre et l'air chaud et sec. Surveiller les cochenilles, chenilles et dépérissements. Arroser selon l'humidité réelle du substrat ; ne pas laisser d'eau dans la soucoupe. Ne pas cumuler repotage et taille sévère.