

CARMONA MICROPHYLLA

Ehretia microphylla

FICHE DE CULTURE | BONSAI D'INTÉRIEUR

Ce Bonsai subtropical demande une lumière abondante et des températures régulières. Sa croissance dépend directement de la chaleur, de l'éclairage et du drainage. La conduite de Ehretia microphylla exige une observation quotidienne des pousses et de l'état de la motte.



01 EMPLACEMENT

Fenêtre très lumineuse, température stable de 18 à 26 °C; éviter de descendre sous 15 °C. Adapter l'exposition progressivement après tout déplacement. Observer la vigueur et la couleur du feuillage; ne pas imposer de changement brutal après un repotage.

02 ARROSAGE

Arroser lorsque la surface commence à sécher; évacuer toute eau stagnante de la soucoupe. Vérifier l'humidité en profondeur avec une baguette avant d'intervenir. Arroser uniformément toute la motte, jusqu'à écoulement par les trous de drainage, puis laisser égoutter.

03 TAILLE

Rabattre les nouvelles pousses à deux ou trois feuilles; intervenir progressivement. Désinfecter les outils et conserver des rameaux relais. Éviter de cumuler taille sévère, repotage et forte ligature au cours d'une même période de récupération.

04 ENGRAIS

Engrais équilibré faiblement dosé une fois par mois toute l'année en croissance active. Appliquer l'engrais sur un substrat déjà humide. Ajuster les quantités à la vigueur, à la lumière et au volume racinaire; interrompre les apports sur arbre affaibli.

05 REMPOTAGE

Printemps chaud, substrat très drainant; conserver suffisamment de racines fines. Stabiliser l'arbre dans son pot et protéger du vent et du soleil intense après intervention. Reprendre la fertilisation uniquement après apparition d'une croissance saine.

06 LIGATURE

Rameaux rapidement cassants; ligatures légères, contrôlées très fréquemment. Poser les fils à angle régulier sans étranglement. Vérifier fréquemment la prise de diamètre; retirer en coupant les spires plutôt qu'en déroulant brutalement.

CONSEILS IMPORTANTS

Aucun repos hivernal; les chutes de feuilles signalent souvent un stress de lumière ou d'arrosage. Surveiller régulièrement les parasites et adapter les soins aux conditions locales. Après un stress important, privilégier la reprise de vigueur avant tout travail esthétique.