

CITRUS MYRTIFOLIA

Citrus myrtifolia

FICHE DE CULTURE | BONSAI D'MÉDITERRANÉEN

Espèce méditerranéenne sensible aux gels en pot. La qualité de la lumière, le drainage et l'hivernage conditionnent son équilibre. La conduite de Citrus myrtifolia exige une observation quotidienne des pousses et de l'état de la motte.



01 EMLACEMENT

Plein soleil progressif; protéger sous abri lumineux lorsque les températures approchent 3 à 5 °C. Adapter l'exposition progressivement après tout déplacement. Observer la vigueur et la couleur du feuillage; ne pas imposer de changement brutal après un repotage.

03 TAILLE

Raccourcir les pousses après la croissance; préserver quelques rameaux florifères si des fruits sont souhaités. Désinfecter les outils et conserver des rameaux relais. Éviter de cumuler taille sévère, repotage et forte ligature au cours d'une même période de récupération.

05 REMPOTAGE

Printemps après reprise végétative; substrat minéral aéré avec légère fraction organique. Stabiliser l'arbre dans son pot et protéger du vent et du soleil intense après intervention. Reprendre la fertilisation uniquement après apparition d'une croissance saine.

02 ARROSAGE

Arroser abondamment quand la surface sèche; réduire nettement en hivernage frais. Vérifier l'humidité en profondeur avec une baguette avant d'intervenir. Arroser uniformément toute la motte, jusqu'à écoulement par les trous de drainage, puis laisser égoutter.

04 ENGRAIS

Engrais spécial agrumes riche en oligoéléments pendant la croissance; surveiller chlorose et carences. Appliquer l'engrais sur un substrat déjà humide. Ajuster les quantités à la vigueur, à la lumière et au volume racinaire; interrompre les apports sur arbre affaibli.

06 LIGATURE

Rameaux fragiles, souvent épineux; poser les fils sans écraser l'écorce. Poser les fils à angle régulier sans étranglement. Vérifier fréquemment la prise de diamètre; retirer en coupant les spires plutôt qu'en déroulant brutalement.

CONSEILS IMPORTANTS

Ne pas exposer au gel; maintenir une forte luminosité en hivernage. Surveiller régulièrement les parasites et adapter les soins aux conditions locales. Après un stress important, privilégier la reprise de vigueur avant tout travail esthétique.