


DURANTA

Duranta erecta

FICHE DE CULTURE | BONSAI D'INTÉRIEUR

Ce Bonsai subtropical demande une lumière abondante et des températures régulières. Sa croissance dépend directement de la chaleur, de l'éclairage et du drainage. La conduite de *Duranta erecta* exige une observation quotidienne des pousses et de l'état de la motte.



01 EMBLACEMENT

Lumière très vive et soleil doux; hivernage lumineux au-dessus de 12 à 15 °C. Adapter l'exposition progressivement après tout déplacement. Observer la vigueur et la couleur du feuillage; ne pas imposer de changement brutal après un repotage.

02 ARROSAGE

Arroser abondamment en croissance après léger séchage de surface; réduire en hiver frais. Vérifier l'humidité en profondeur avec une baguette avant d'intervenir. Arroser uniformément toute la motte, jusqu'à écoulement par les trous de drainage, puis laisser égoutter.

03 TAILLE

Pincer régulièrement les jeunes pousses pour densifier; préserver la floraison selon l'objectif. Désinfecter les outils et conserver des rameaux relais. Éviter de cumuler taille sévère, repotage et forte ligature au cours d'une même période de récupération.

04 ENGRAIS

Engrais équilibré mensuel en croissance active, espacé en hiver selon vigueur. Appliquer l'engrais sur un substrat déjà humide. Ajuster les quantités à la vigueur, à la lumière et au volume racinaire; interrompre les apports sur arbre affaibli.

05 REMPOTAGE

Printemps chaud, substrat minéral drainant avec rétention modérée. Stabiliser l'arbre dans son pot et protéger du vent et du soleil intense après intervention. Reprendre la fertilisation uniquement après apparition d'une croissance saine.

06 LIGATURE

Ligaturer tôt les jeunes rameaux; les branches lignifiées cassent facilement. Poser les fils à angle régulier sans étranglement. Vérifier fréquemment la prise de diamètre; retirer en coupant les spires plutôt qu'en déroulant brutalement.

CONSEILS IMPORTANTS

Protéger du froid; feuilles et fruits ne doivent pas être ingérés. Surveiller régulièrement les parasites et adapter les soins aux conditions locales. Après un stress important, privilégier la reprise de vigueur avant tout travail esthétique.