

ÉRABLE DU JAPON

Acer palmatum

FICHE DE CULTURE | BONSAI D'EXTÉRIEUR

Ce Bonsai d'extérieur suit le cycle naturel des saisons. Une culture précise associe exposition adaptée, maîtrise de la vigueur et respect du repos végétatif. La conduite de Acer palmatum exige une observation quotidienne des pousses et de l'état de la motte.



01 EMPLACEMENT

Soleil matinal et mi-ombre aux heures chaudes; protéger du vent desséchant. Adapter l'exposition progressivement après tout déplacement. Observer la vigueur et la couleur du feuillage; ne pas imposer de changement brutal après un repotage.

02 ARROSAGE

Arroser abondamment lorsque la surface sèche; surveiller la motte pendant les fortes chaleurs. Vérifier l'humidité en profondeur avec une baguette avant d'intervenir. Arroser uniformément toute la motte, jusqu'à écoulement par les trous de drainage, puis laisser égoutter.

03 TAILLE

Taille des entre-nœuds longs après maturation; taille structurelle à la chute des feuilles ou en fin d'hiver selon risque de saignement. Désinfecter les outils et conserver des rameaux relais. Éviter de cumuler taille sévère, repotage et forte ligature au cours d'une même période de récupération.

04 ENGRAIS

Engrais doux au printemps puis en automne; limiter l'azote pour préserver les entre-nœuds courts. Appliquer l'engrais sur un substrat déjà humide. Ajuster les quantités à la vigueur, à la lumière et au volume racinaire; interrompre les apports sur arbre affaibli.

05 REMPOTAGE

Avant débourrement, tous les deux à trois ans; akadama/pumice, racines réparties radialement. Stabiliser l'arbre dans son pot et protéger du vent et du soleil intense après intervention. Reprendre la fertilisation uniquement après apparition d'une croissance saine.

06 LIGATURE

Jeunes pousses fragiles; protéger l'écorce et contrôler rapidement les marques. Poser les fils à angle régulier sans étranglement. Vérifier fréquemment la prise de diamètre; retirer en coupant les spires plutôt qu'en déroulant brutalement.

CONSEILS IMPORTANTS

Éviter soleil brûlant et sécheresse, responsables de brûlures marginales des feuilles. Surveiller régulièrement les parasites et adapter les soins aux conditions locales. Après un stress important, privilégier la reprise de vigueur avant tout travail esthétique.