


FICUS RETUSA

Ficus microcarpa

FICHE DE CULTURE | BONSAI D'INTÉRIEUR

Ce Bonsai subtropical demande une lumière abondante et des températures régulières. Sa croissance dépend directement de la chaleur, de l'éclairage et du drainage. La conduite de Ficus microcarpa exige une observation quotidienne des pousses et de l'état de la motte.



01 EMBLACEMENT

Lumière intense derrière une fenêtre; sortie estivale progressive possible au-dessus de 15 °C. Adapter l'exposition progressivement après tout déplacement. Observer la vigueur et la couleur du feuillage; ne pas imposer de changement brutal après un repotage.

02 ARROSAGE

Arroser abondamment après léger séchage de la surface; ne jamais laisser d'eau stagnante. Vérifier l'humidité en profondeur avec une baguette avant d'intervenir. Arroser uniformément toute la motte, jusqu'à écoulement par les trous de drainage, puis laisser égoutter.

03 TAILLE

Rabattre les pousses à deux feuilles après six à huit feuilles; défoliation partielle seulement sur arbre très vigoureux. Désinfecter les outils et conserver des rameaux relais. Éviter de cumuler taille sévère, repotage et forte ligature au cours d'une même période de récupération.

04 ENGRAIS

Engrais équilibré une fois par mois toute l'année si croissance active; adapter à la lumière hivernale. Appliquer l'engrais sur un substrat déjà humide. Ajuster les quantités à la vigueur, à la lumière et au volume racinaire; interrompre les apports sur arbre affaibli.

05 REMPOTAGE

Fin de printemps à été chaud; substrat akadama/pumice drainant, conserver les racines actives. Stabiliser l'arbre dans son pot et protéger du vent et du soleil intense après intervention. Reprendre la fertilisation uniquement après apparition d'une croissance saine.

06 LIGATURE

Rameaux jeunes flexibles; contrôler les fils fréquemment en période de croissance rapide. Poser les fils à angle régulier sans étranglement. Vérifier fréquemment la prise de diamètre; retirer en coupant les spires plutôt qu'en déroulant brutalement.

CONSEILS IMPORTANTS

Éviter courants d'air froid et changements brusques de lumière. Surveiller régulièrement les parasites et adapter les soins aux conditions locales. Après un stress important, privilégier la reprise de vigueur avant tout travail esthétique.