

METASEQUOIA

Metasequoia glyptostroboides

FICHE DE CULTURE | BONSAI D'EXTÉRIEUR

Ce Bonsai d'extérieur suit le cycle naturel des saisons. Une culture précise associe exposition adaptée, maîtrise de la vigueur et respect du repos végétatif. La conduite de Metasequoia glyptostroboides exige une observation quotidienne des pousses et de l'état de la motte.



01 EMLACEMENT

Extérieur permanent, plein soleil à mi-ombre; protéger du dessèchement estival. Adapter l'exposition progressivement après tout déplacement. Observer la vigueur et la couleur du feuillage; ne pas imposer de changement brutal après un rempotage.

02 ARROSAGE

Espèce très consommatrice d'eau: maintenir une humidité régulière, sans asphyxie prolongée. Vérifier l'humidité en profondeur avec une baguette avant d'intervenir. Arroser uniformément toute la motte, jusqu'à écoulement par les trous de drainage, puis laisser égoutter.

03 TAILLE

Tailler les pousses allongées en saison; sélectionner les bourgeons pour conserver une silhouette conique. Désinfecter les outils et conserver des rameaux relais. Éviter de cumuler taille sévère, rempotage et forte ligature au cours d'une même période de récupération.

04 ENGRAIS

Engrais organique au printemps et à l'automne; interruption en hiver et fortes chaleurs. Appliquer l'engrais sur un substrat déjà humide. Ajuster les quantités à la vigueur, à la lumière et au volume racinaire; interrompre les apports sur arbre affaibli.

05 REMPOTAGE

Au début du printemps, tous les deux à trois ans; mélange minéral conservant une bonne humidité. Stabiliser l'arbre dans son pot et protéger du vent et du soleil intense après intervention. Reprendre la fertilisation uniquement après apparition d'une croissance saine.

06 LIGATURE

Jeunes rameaux souples, ligature légère et contrôles rapprochés. Poser les fils à angle régulier sans étranglement. Vérifier fréquemment la prise de diamètre; retirer en coupant les spires plutôt qu'en déroulant brutalement.

CONSEILS IMPORTANTS

Conifère caduc: la chute automnale des aiguilles est normale, pas un dépérissement. Surveiller régulièrement les parasites et adapter les soins aux conditions locales. Après un stress important, privilégier la reprise de vigueur avant tout travail esthétique.