

MYRTE - SYZYGIUM OBTUSIFOLIUM

Syzygium obtusifolium

FICHE DE CULTURE | BONSAI D'INTÉRIEUR

Ce Bonsai subtropical demande une lumière abondante et des températures régulières. Sa croissance dépend directement de la chaleur, de l'éclairage et du drainage. La conduite de Syzygium obtusifolium exige une observation quotidienne des pousses et de l'état de la motte.



01 EMLACEMENT

Emplacement très lumineux, chaleur régulière; protéger sous 12 à 15 °C et des courants d'air. Adapter l'exposition progressivement après tout déplacement. Observer la vigueur et la couleur du feuillage; ne pas imposer de changement brutal après un repotage.

02 ARROSAGE

Arroser abondamment lorsque la surface commence à sécher; maintenir une fraîcheur régulière sans excès. Vérifier l'humidité en profondeur avec une baguette avant d'intervenir. Arroser uniformément toute la motte, jusqu'à écoulement par les trous de drainage, puis laisser égoutter.

03 TAILLE

Pincer les pousses après quatre à six feuilles, rabattre à deux pour favoriser une ramification fine. Désinfecter les outils et conserver des rameaux relais. Éviter de cumuler taille sévère, repotage et forte ligature au cours d'une même période de récupération.

04 ENGRAIS

Engrais équilibré dilué une fois par mois toute l'année si la croissance se maintient. Appliquer l'engrais sur un substrat déjà humide. Ajuster les quantités à la vigueur, à la lumière et au volume racinaire; interrompre les apports sur arbre affaibli.

05 REMPOTAGE

Au printemps chaud, tous les deux à trois ans; akadama/pumice drainant, conserver les racines fines. Stabiliser l'arbre dans son pot et protéger du vent et du soleil intense après intervention. Reprendre la fertilisation uniquement après apparition d'une croissance saine.

06 LIGATURE

Ligaturer les jeunes rameaux, contrôler les marques fréquentes sur l'écorce. Poser les fils à angle régulier sans étranglement. Vérifier fréquemment la prise de diamètre; retirer en coupant les spires plutôt qu'en déroulant brutalement.

CONSEILS IMPORTANTS

Culture tropicale sans repos hivernal marqué; éviter toute exposition au gel. Surveiller régulièrement les parasites et adapter les soins aux conditions locales. Après un stress important, privilégier la reprise de vigueur avant tout travail esthétique.