


PORTULACARIA AFRA

Portulacaria afra

FICHE DE CULTURE | BONSAI D'INTÉRIEUR

Ce Bonsai subtropical demande une lumière abondante et des températures régulières. Sa croissance dépend directement de la chaleur, de l'éclairage et du drainage. La conduite de Portulacaria afra exige une observation quotidienne des pousses et de l'état de la motte.



01 EMPLACEMENT

Très forte lumière et plusieurs heures de soleil acclimaté; protéger sous 10 à 12 °C. Adapter l'exposition progressivement après tout déplacement. Observer la vigueur et la couleur du feuillage; ne pas imposer de changement brutal après un repotage.

02 ARROSAGE

Arroser abondamment puis laisser sécher une large part du substrat avant nouvel apport. Vérifier l'humidité en profondeur avec une baguette avant d'intervenir. Arroser uniformément toute la motte, jusqu'à écoulement par les trous de drainage, puis laisser égoutter.

03 TAILLE

Tailler les pousses après plusieurs paires de feuilles; laisser sécher les coupes épaisses. Désinfecter les outils et conserver des rameaux relais. Éviter de cumuler taille sévère, repotage et forte ligature au cours d'une même période de récupération.

04 ENGRAIS

Engrais léger une fois par mois en période de croissance; très modéré en hiver peu lumineux. Appliquer l'engrais sur un substrat déjà humide. Ajuster les quantités à la vigueur, à la lumière et au volume racinaire; interrompre les apports sur arbre affaibli.

05 REMPOTAGE

Fin de printemps en substrat très minéral et drainant; laisser cicatriser les racines blessées. Stabiliser l'arbre dans son pot et protéger du vent et du soleil intense après intervention. Reprendre la fertilisation uniquement après apparition d'une croissance saine.

06 LIGATURE

Branches cassantes et gorgées d'eau; taille directionnelle préférable à la ligature. Poser les fils à angle régulier sans étranglement. Vérifier fréquemment la prise de diamètre; retirer en coupant les spires plutôt qu'en déroulant brutalement.

CONSEILS IMPORTANTS

La pourriture racinaire est favorisée par le froid associé à un substrat humide. Surveiller régulièrement les parasites et adapter les soins aux conditions locales. Après un stress important, privilégier la reprise de vigueur avant tout travail esthétique.