


PYRACANTHA COCCINEA

Pyracantha coccinea

FICHE DE CULTURE | BONSAI D'EXTÉRIEUR

Ce Bonsai d'extérieur suit le cycle naturel des saisons. Une culture précise associe exposition adaptée, maîtrise de la vigueur et respect du repos végétatif. La conduite de Pyracantha coccinea exige une observation quotidienne des pousses et de l'état de la motte.



01 EMPLACEMENT

Plein soleil à mi-ombre; exposition ensoleillée pour floraison et baies. Adapter l'exposition progressivement après tout déplacement. Observer la vigueur et la couleur du feuillage; ne pas imposer de changement brutal après un repotage.

02 ARROSAGE

Arroser abondamment après léger séchage de surface; surveiller lors de la fructification. Vérifier l'humidité en profondeur avec une baguette avant d'intervenir. Arroser uniformément toute la motte, jusqu'à écoulement par les trous de drainage, puis laisser égoutter.

03 TAILLE

Tailler après floraison en préservant les rameaux porteurs de fruits; attention aux épines. Désinfecter les outils et conserver des rameaux relais. Éviter de cumuler taille sévère, repotage et forte ligature au cours d'une même période de récupération.

04 ENGRAIS

Engrais organique au printemps et en automne; éviter l'azote excessif. Appliquer l'engrais sur un substrat déjà humide. Ajuster les quantités à la vigueur, à la lumière et au volume racinaire; interrompre les apports sur arbre affaibli.

05 REMPOTAGE

Au printemps, tous les deux à trois ans; akadama/pumice bien drainant. Stabiliser l'arbre dans son pot et protéger du vent et du soleil intense après intervention. Reprendre la fertilisation uniquement après apparition d'une croissance saine.

06 LIGATURE

Jeunes branches souples; protéger les mains et surveiller les marques des fils. Poser les fils à angle régulier sans étranglement. Vérifier fréquemment la prise de diamètre; retirer en coupant les spires plutôt qu'en déroulant brutalement.

CONSEILS IMPORTANTS

La taille des rameaux fleuris réduit la fructification de la saison. Surveiller régulièrement les parasites et adapter les soins aux conditions locales. Après un stress important, privilégier la reprise de vigueur avant tout travail esthétique.